

Pneumonie à *Mycoplasma pneumoniae* : choix de l'antibiothérapie

		Enfant	Adulte
en première intention : macrolides	Clarithromycine	≤ 60 kg : 15 mg/kg/j en 2 prises (soit 1 dose/poids matin et soir) pendant 5 jours	500 mg matin et soir pendant 5 jours
	Azithromycine	< 25 kg : 20 mg/kg/j en 1 prise (soit 1 dose/poids 1 fois par jour) pendant 3 jours ≥ 25 kg : 500 mg/j en 1 prise pendant 3 jours	J1 : 500 mg/j en 1 prise J2 à J5 : 250mg/j en 1 prise
en cas de rupture d'approvisionnement des deux premiers : autres macrolides	Spiramycine	Contre-indiqué	3 MUI matin, midi et soir pendant 7 jours
	Roxithromycine	6 à 11 kg : 25 mg matin et soir pendant 10 jours 12 à 23 kg : 50 mg matin et soir pendant 10 jours 24 à 40 kg : 100 mg matin et soir pendant 10 jours	150 mg matin et soir pendant 10 jours
en cas d'allergie ou de contre-indication aux macrolides	Pristinamycine	à partir de 6 ans : 50 mg/kg/j en 2 ou 3 prises pendant 7 jours	1 g matin midi et soir pendant 7 jours
	Doxycycline	à partir de 12 ans : 200 mg à J1 (en 1 prise ou en doses fractionnées) puis 100 mg/j de J2 à J7	> 60 kg : 200 mg/j pendant 7 jours < 60 kg : 200 mg à J1 (en 1 prise) puis 100 mg/j de J2 à J7
en dernier recours, dans le cadre d'une décision partagée	Lévofloxacine	Contre-indiqué	500 mg 1 fois par jour pendant 7 jours

Adapté de : Haute Autorité de Santé. Réponse rapide sur la prise en charge diagnostique et thérapeutique des pneumonies atypiques à *Mycoplasma pneumoniae* en ambulatoire chez l'enfant et l'adulte. Saint-Denis (France) : Haute Autorité de Santé ; déc. 2023. 6 p. https://www.has-sante.fr/icms/p_3482996/fr

Document attaché au guide de pratique clinique : ebmfrance. Pneumonie à *Mycoplasma pneumoniae* chez enfants et adultes. Disponible en ligne : <https://www.ebmfrance.net/fr/Pages/fra/ebm/ebm0071f.aspx>