

Annexe 4 : Score de troubles cognitifs : MoCA (Montreal Cognitive Assessment, version française)

MONTREAL COGNITIVE ASSESSMENT (MOCA)
Version 7.1 **FRANÇAIS**

NOM : _____
 Scolarité : _____
 Sexe : _____
 Date de naissance : _____
 DATE : _____

VISUOSPATIAL / EXÉCUTIF		Copier le cube		Dessiner HORLOGE (11 h 10 min) (3 points)		POINTS								
				<input type="checkbox"/> Contour <input type="checkbox"/> Chiffres <input type="checkbox"/> Aiguilles		___/5								
DÉNOMINATION														
						___/3								
MÉMOIRE		VISAGE		VELOURS		ÉGLISE		MARGUERITE		ROUGE		Pas de point		
Lire la liste de mots, le patient doit répéter. Faire 2 essais même si le 1er essai est réussi. Faire un rappel 5 min après.		1 ^{er} essai		2 ^{ème} essai										
ATTENTION Lire la série de chiffres (1 chiffre/ sec.). Le patient doit la répéter. [] 2 1 8 5 4 Le patient doit la répéter à l'envers. [] 7 4 2														
Lire la série de lettres. Le patient doit taper de la main à chaque lettre A. Pas de point si 2 erreurs												___/1		
Soustraire série de 7 à partir de 100.		[] 93		[] 86		[] 79		[] 72		[] 65		___/3		
LANGAGE Répéter : Le colibri a déposé ses œufs sur le sable. [] L'argument de l'avocat les a convaincus. []												___/2		
Fluidité de langage. Nommer un maximum de mots commençant par la lettre «F» en 1 min												___/1		
ABSTRACTION Similitude entre ex : banane - orange = fruit [] train - bicyclette [] montre - règle												___/2		
RAPPEL		VISAGE		VELOURS		ÉGLISE		MARGUERITE		ROUGE		Points pour rappel SANS INDICES seulement		
Doit se souvenir des mots SANS INDICES		[]		[]		[]		[]		[]				
Optionnel		Indice de catégorie		Indice choix multiples										
ORIENTATION		[] Date		[] Mois		[] Année		[] Jour		[] Endroit		[] Ville		___/6
© Z.Nasreddine MD		www.mocatest.org		Normal ≥ 26 / 30		TOTAL		___/30		Ajouter 1 point si scolarité ≤ 12 ans				
Administré par : _____														

Le Montreal Cognitive Assessment (MoCA) constitue le test d'évaluation rapide le plus sensible et évaluant le plus largement (attention, concentration, fonctions exécutives, mémoire, langage, capacités visuo-constructives, abstraction, calcul, orientation) les fonctions cognitives. Il tend à se substituer au MMSE en pratique clinique.

Un score 26 (25 si niveau culturel ≤ 3 = diplôme primaire = CEP) est considéré comme anormal.

Source : Nasreddine ZS, Phillips NA, Bédirian V, Charbonneau S, Whitehead V, Collin I, Cummings JL, Chertkow H. The Montreal Cognitive Assessment, MoCA: a brief screening tool for mild cognitive impairment. J Am Geriatr Soc. 2005 Apr;53(4):695-9. doi: 10.1111/j.1532-5415.2005.53221.x. Erratum in: J Am Geriatr Soc. 2019 Sep;67(9):1991. PMID: 15817019.